ମ୍ୟୁଥେନ୍ ଆଡ୍‌ଭାନ୍ସ (ସଂସ୍ଥି

ମାନ୍‌କୋଜେବ ୭୫% ଡବ୍ଲୁଜି ଫିମିନାଶକ)

ମାନ୍‌କୋଜେବ ୭୫% ଡବ୍ଲୁଜି ଫିମିନାଶକ ରେ ଅଛି ମାନ୍‌କୋଜେବ୍ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ଓ ବାକି ସହାୟକ ତଥା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ । ବିଲାତି ବାଇଗଣର ଶୁଖିଆ ଅଙ୍ଗମାରୀ, ଆଳୁର ଲଡୁରା ଅଙ୍ଗମାରୀ ଏବଂ ସେଓ ର ଯାଉରା ରୋଗ, ଅସମୟରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା, ଅଲ୍‌ଟର୍‌ନେରିଆ ସ୍ପଟ୍/ବ୍ଲାଇଟ୍‌ଶୁଖା ଜୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା :

ମାନ୍‌କୋଜେବ ଟେକ୍‌ନିକଲ୍ (୮୫% ଶୁଦ୍ଧତା) :	୮୮.୨୩% ଓ/ଓ
ବିଚ୍ଛୁରକ ଘଟକ :	
ସୋଡିଅମ ଲିଗ୍‌ନୋ ସଲ୍‌ଫୋନେଟ୍	: ୭.୦୦% ଓ/ଓ
ଓ୍ୱେଟିଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ :	
ସଲ୍‌ଫୋନେଟେଡ୍ ନାପ୍‌ଥାଲିନ୍	: ୧.୫୦% ଓ/ଓ
ସଲ୍‌ଫୋନେଟ୍, ସୋଡିଅମ ସଲ୍‌ଟ	
ବାଇଣ୍ଡର୍ : ଜେଲ୍‌ସଟ୍ରୋଲ୍	: ୩.୨୨% ଓ/ଓ
ମୋଟ	: ୧୦୦.୦୦% ୱଜନ/ୱଜନ

ସୁପାରିଶ :

ଫସଲ (ସବୁ)	ରୋଗର ଜଣାଶୁଣା ନାମ	ମାତ୍ର / ହେକ୍‌ଟର୍ ଏ.ଉ. (ଗ୍ରା.)	ମାତ୍ର / ହେକ୍‌ଟର୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତଜଳ (ଗ୍ରା.)	ମିଶାଇବା ପାଣି (ଲିଟର)	ଶେଷ ସିଞ୍ଚନ ଠାରୁ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି (ଦିନ)
ଆଳୁ	ଲଡୁର ଅଙ୍ଗମାରୀ	୭୫୦	୧୦୦୦	୫୦୦	୩-୫
ବିଲାତି ବାଇଗଣ	ସଢ଼ନ ଅଙ୍ଗମାରୀ	୭୫୦	୧୦୦୦	୫୦୦	୫-୬
ସେଓ	ଯାଉରା, ଅସମୟରେପତ୍ର ଝଡ଼ା, ଅଲ୍‌ଟର୍‌ନେରିଆ ଝଡ଼/ବ୍ଲାଇଟ୍‌ଶୁଖା, ଜୁର	୧୮.୭୫- ୨୫.୩ ୨୨.୫ ଗଛ /ଗଛ	୨୫-୩୦/ ଗଛ	୧୦/ଗଛ /ଗଛ	୪୦

ପ୍ରୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ : ବ୍ୟବହୃତ ପାଦପ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ : ହସ୍ତଚାଳିତ ନାପ୍‌ସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗ୍ରେଶନ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର, ଫୁଟ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ଭିମା ମୋଟରାଇଜ୍‌ଡ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ଆଦି ।

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ :

ସତର୍କତା : ୧) ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ, ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରାଣୀଚାରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଅଇଲା ରଖନ୍ତୁ । ୨) ଭୁଷ, ଆଖୁ ଓ ବେହେରେ ସଂସ୍ପର୍ଶ/ପଡ଼ିବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ୩) ସିଞ୍ଚିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶ୍ୱାସରେ ଯିବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ । ପବନ ବୋହିବା ପଟୁ ହିଁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ୪) ସିଞ୍ଚନ ସମୟରେ ଯେତେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଆନ୍ତୁ, ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଧୂମପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୬) ଏହାକୁ ମିଶାଇବା ଓ ସିଞ୍ଚିବା ବେଳେ ପୁରା ହାତବାଲା ଶାର୍ଟ, ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ରସାୟନ ପ୍ରତିରୋଧି ଦସ୍ତାନା, ଜୋତା, ଗଗଲ୍‌ସ, ଟୋପି ଓ ମୁଖା ପରି ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।

ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ : ଭୁଷେଇ ହେବା, ଜମ ମାଜପୁରା ବୁଦ୍ଧିହେବା, ଛାତି ରୁଦ୍ଧିହେବା, ଜୁରୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିବା ଓ ହାଇପୋଟେନ୍‌ସନ୍ । ବେହେରେ ଗରଲ ଅଣ୍ଟ ଉଠିବା, ବାନ୍ତି ହେବା ଓ ଅତିସାର, ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ତଥା ଆଟାକ୍‌ସିଆ ହୋଇପାରେ ।

ପ୍ରଥମୋପଚାର : ପେଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତଣ୍ଟି ସାଙ୍ଗିଦେଇ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ । ବେହେରେ ଲାଗିଥିଲେ, ସେହି ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସାବୁନରେ ସଫାକରି ଧୁଅନ୍ତୁ । ରୋଗୀକୁ ଖୋଲା ପବନରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ବିଷଘ୍ନ : ଜୋକିସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷ ନିବାରକ ଜଣାନାହିଁ । ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ ।

ପାଦପ ବିଷାକ୍ତତା :

ଖାଲି ପାତ୍ର ବିଧ୍ୱଂସିକରଣ : ୧) ପାତ୍ରକୁ ଜଳବହନ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ଭାଙ୍ଗିଚୁଲ୍ଲି ପୋତିଦିଅନ୍ତୁ । ୨) ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ରକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ/ପୋତାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେହି ତାକୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ କରାଇ ଶତ୍ରିକ୍ତ ହୋଇପାରେ । ୩) ପ୍ୟାକେଜ୍, ବଳକା ପଦାର୍ଥ ଓ ତା'ର ଖୋଳ/ଗାପିଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ନିରାପଦରେ ଏଭଳି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ପରିବେଶ କି ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ ।

ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚି : ୧) ଫିମିନାଶକ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ/କୁମ୍ଭକ କଣ୍ଟେନର୍‌ରେ ରଖି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଅଲଗା ଏକ କୋଠରୀ ବା ସ୍ଥାନରେ ମହତ୍ତୁ କରିବା ଉଚିତ, ଅଥବା ଅନ୍ୟତ୍ର ତାଲା ପକାଇ ମହତ୍ତୁ କରନ୍ତୁ । ୨) ଫିମିନାଶକ ମହତ୍ତୁ କରାଯିବା ସ୍ଥାନଟି ସୁତୁନ୍ତୁ, ଶୁଖୁଲା, ଆଲୋକିତ, ବାୟୁବାସ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ।

ସାବଧାନ : ଏହି ଲେବଲ୍/ପତ୍ରିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିବା ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ।

ଉତ୍ପାଦକ : ୟୁପିଏଲ୍ ଲିମିଟେଡ

ପଞ୍ଜିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ : ୩-୧୧, ଜି.ଆଇ.ଡି.ସି., ଭାପି -୩୯୬୧୯୫, ଗୁଜରାତ ।

ಯುತೇನ್ ಅಟ್‌ವಾನ್ಸ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಮೆಂಕೋಜೆಬ್ 75% WG ಪ್ಲುಂಚಣ್ಣಂಕೊಲ್ಲಿ)

ಮೆಂಕೋಜೆಬ್ 75% WG ಪ್ಲುಂಚಣ್ಣಂಕೊಲ್ಲಿಯಿಲ್ ಮೆಂಕೋಜೆಬ್ ತೀವ್ರ ಮೂಲಪೊರುಳ್ ಮತ್ತುಂ ಮೀಕ ಇಣ್ಣಪೆ ಪೊರುಳ್‌ಕಳ್ ಮತ್ತುಂ ಸೆಯಲ್‌ತ ತೀವಣಂಗಳುಕ್ಕು ಅಪ್ಪಾಲ್ ವೈಕ್ಕವುಂ. 2. ವಾಸ್, ಕಣ್‌ಕಳ್ ಮತ್ತುಂ ಸ್ರುಂತಿಯಿಲ್ ಪಡುವತೈ ತವಿರ್ಕ್ಕವುಂ. 3. ದೆಸಿಗಳ್‌ಪುರ್‌ವುಮ್ ಉಟ್ಕಾವಶಿಕ್ಕಪ್ಪಡುವತೈ ತವಿರ್ಕ್ಕವುಂ. ಕಾಗ್ರು ವೀಕಮಿಕವಿಲೆಯೇ ತೆರಿಕ್ಕವುಂ. 4. ದೆಸಿಗಳ್ ಮುಳ್ತತ ಪಿರಗು ಮಾಸಪಟ್ಟ ಆಡೈಕಳ್ ಮತ್ತುಂ ಉಲ್ ಪಾಕಂಗಳೈ ನನ್ರಾಕ ಕ�ழುವವುಂ. 5. ದೆಸಿಕ್ಕುಂ ಪೊರು ಪುಕೆಪಿಡಿತ್ತಲ್, ಎತ್ತೈಯುಂ ಪರುಕ್ಕುಲ್, ಉಣ್ಣುತಲ್ ಮತ್ತುಂ ಮೆಲ್ಲುತಲ್ ಕೂಡಾತು. 6. ಕಲಕ್ಕುಂ ಪೋತುಂ ದೆಸಿಗಳ್‌ಕುಂ ಪೊತುಂ ಮುழுಕ್ಕ ಸ್ವೆದ, ಕಣ್ಣಾನ ಪೆಣ್‌ಪಲ್, ಇರಸಾಯನತ್ತೈ ತಾಗ್ಕುಂ ಕೈಯುಕರಂಕಳ್, ಷಷ್ಠಿಕಳ್, ಕಣ್ಣಾಗಿ ತೊಪ್ಪಿ ಮತ್ತುಂ ಮುಕಮ್ಮೂಡಿ ಪೋನ್ರ ಮುழு ಪಾಡುಕಾப್ಪು ಉಡೈಕಳೈ ಅಣಿಯವುಂ.

ವಿಷಕ್ತಿಂಪಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಕಳ ಅறிಕುರಿಕ್ಕಳ್: ಅಗಿப್ಪು, ಕುಲಾற್ಱ ಮೂಕ್ಕಪಟ್ಟು, ದೆಳ್ಳುಕ ಇರುಕ್ಕುಂ, ಪಟಪಟ್ಪು ಮತ್ತುಂ ಅಧಿಕ ಇರತ್ತ ಅ೦ಭತ್ತುಂ. ಒட್ಕಿಕೊಳ್ಳುಪ್ಪಟ್ಟಾಲ್ ಕುಮಟ್ಟಲ್, ವಾಸ್ತಿ ಮತ್ತುಂ ವಯಿற்ಱುப்போக்கு, ಒಲ್ ವெಪ್ಪಕ್ಕುರವು ಮತ್ತುಂ ತள್ಳಾட்டம் ஏற்படலாம்.

ಮುತಲುತವಿ: ವಿழுங்கப்பட்டிருந்தால், தொண்டைக்குள் விரலலவிட்டு வாந்தி எடுக்கத் தூண்டவும். சருமம் மாசுபட்டிருந்தால் மாசு பட்ட சருமத்தை அதிக அளவு சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டம் உள்ள பகுதிக்கு அழைத்துச் செல்லவும்.

ಮಾற್ಱು ಮರುನ್ತು: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து ஏதும் அறியப்படவில்லை. அறிகுறிக்குத்தக்க சிகிச்சை அளிக்கவும்.

ತವಿರ್‌ವಿಕ್ಕತ್ತಕ್ಕನ್ಮ :

ಉಪಯೋಕಪ್ಪಡುತ್ತಿಯ ಕೊಳ್ ಕಲನೈ ಅப்புறப்படுத்துதல்: 1. பேக்கேஜ்கள் வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் உடைத்து புதைக்கப்பட வேண்டும். 2. உபயோகப்படுத்தப்பட்ட கொள்கலன்கள் மற்றும் பேக்கேஜ்கள் அதன் மறு உபயோகத்தை தவிர்க்க வெளியே விட்டு வைக்கக்கூடாது. 3. பேக்கேஜ் அல்லது உபரி பொருள்கள் மற்றும் இயந்திரங்களையும் கொள்கலன்களையும் கழுவிய நீர் இவற்றை சுற்றுச் சூழல் அல்லது நீர்நிலை மாசு படாதவாறு பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

ಕೀಮಿಪ್ಪು ನಿಲವರ�ங್ಕಳ್: 1. பூஞ்சணக்கொல்லி அடங்கிய பேக்கேஜ்கள், இதர பொருள்கள் குறிப்பாக உணவுப்பண்டங்கள் கீமிக்கப் பயன் படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது இடங்களுக்கு அப்பால் தனி அறைகள் அல்லது இடங்களில் சேமித்து வைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது பூஞ்சணக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மை பொருத்து தனி அலமாரிகளில் பூட்டி வைக்கப்பட வேண்டும். 2. பூஞ்சணக்கொல்லி கேமித்து வைக்கப் பயன்படும் அறைகள் அல்லது இடங்கள் நன்றாக கட்டப்பட்டதாக, நல்ல வெளிச்சமுள்ளதாக, காற்றோட்டமுள்ளதாக, மற்றும் போதுமான அளவுடையதாய் இருக்க வேண்டும். கேமிப்பு நிலவரம் நன்கு உலர்ந்தும் குளிர்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும்.

ಎச್ಚರಿಕ್ಕೈ: ಲೇಬಿಲ್ / ಕೈಯೇಟ್ಟಿಲ್ ಕುರಿಪ್ಪಿಟ್ಟಿರುಕ್ಕುಂ ಪಯಿರ್‌ಕಳೈತ್ ತವಿರ ವೇಱು ಪಯಿರ್‌ಕಳ್ ಮೀತು ಪಯன்படுத்தக் கூடாது.

ಉற்பத்தியாளர்கள்: யுபிஎல் லிமிடெட்

ಪದಿವು ಅலுವಲಕ: 3-11, ஜி.ஐ.டி.ஸி., வாபி-396 195, குஜராத்

ಯುಥೇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ (ಸ್ಪರ್ಶ

ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಿ)

ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿಒಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಿ, ಇದುಲ್ ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ ಮರುತ್ತಿನ ಘಟಿತಾಂಶಾಲು ಮರಿಯು ಮಿಗಿನವು ಅತ್ಯಲಿಲು ಮರಿಯು ಮಂದಕೊಂಡ ಪದಾರ್ಥಾಲು ಉಂಟಾಯು. ಇದಿ ಟೌಮೆಟ್ ಪಂಟಪೈ ವచ್ಚೆ ಎಂಡು ತೆಗುಲು, ಬಂಗಾಳದುಂಪೈ ವచ್ಚೆ ಕೊಮ್ಮ ಎಂಡುತೆಗುಲು ಮರಿಯು ಆಪಿల్ ಪಂಟಪೈ ವచ್ಚೆ ಗಜ್ಜಿ, ಪರಿತಕ್ತ ಮುಂದಿ ಆಕುಲ ರಾಲಂ, ಅಲ್ಟರ್ನೆರಿಯಾ ಮಚ್ಚ/ಬ್ಲೈಟ್‌ಸೂಟ್ ಬ್ಲಾನ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧಂಗ ಪ್ರಭಾವವಂತಮುಯಿನದಿ.

ರಸಾಯನಿಕ ಮಿశ್ರಮಂ :

ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ (85% ಶುದ್ಧತ):	88.23%ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ :	
ಸೋಡಿಯಮ್ ಲಿಗ್ನೊ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	7.00 %ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ :	
ಸಲ್ಫೊನೇಟೆಡ್ ನಾಫ್ಥಲೆನ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್, ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್	1.50 %ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಬೈಂಡರ್ : ಡೆಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾಸ್	3.27 %ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಮೊತ್ತಂ:	100.00%ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು

ಸಿಫಾರಸುಲು :

ಪಂಟ (ಲು)	ಪಿಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆರು	ಹೆక్టారುకు/ಮೊತ್ತಾದು ಎಐ (ಗ್ರಾ)	ಮಜ್ಜಮಂ (ಗ್ರಾ)	ಎಂತ ವಿಲೆಲ್ ಕಲಪಾಲಿ (ಲೀ)	ವಿದಿ ವಿಧಾನಮುಲು ಮಂಡಿ ಪಂಟಕ್ಕೆತ ಸಮಯಂ ಮಧ್ಯ ವೆನ ಉಂಡಲಿನಿ ಸಮಯಂ (ರోజులలో)
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಆಂಕ್ಯದ ಅಂಗಮಾರಿ	750	1000	500	3-5
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ	ಆರಂಭದ ಅಂಗಮಾರಿ	750	1000	500	5-6
ನೇಲು	ಕಪ್ಪುರೋಗ, ಆಕಾಲ ಎಲೆ ಉದುರುವಿಕೆ, ಸ್ಟಾಫ್/ಬ್ಲೈಟ್ ಸೂಟಿ ಬ್ಲಾಚ್	18.75 -22.5	25-30/ ಮರ /ಮರ	10/ ಮರ	40
ಆಪಿల్	ಗಜ್ಜಿ, ಪರಿತಕ್ತಕ ಮುಂದೆ ಆಕುಲ ರಾಲಂ, ಆಲ್ಟರ್ನೆರಿಯಾ ಮಚ್ಚ /ಬ್ಲೈಟ್ ಸೂಟಿ ಬ್ಲಾಂಚ್	18.75-22.5	25-30/ ವెట్టುకు	10/ ವెట್ಟುಕು	40
ಬಂಗಾಳ ಕೊಮ್ಮುಎಂಡುತೆಗುಲು ಮುಂಪ		750	1000	500	3-5
ಟೌಮೆಟ್ ಎಂಡುತೆಗುಲು		750	1000	500	5-6
ಆಪಿల్	ಗಜ್ಜಿ, ಪರಿತಕ್ತಕ ಮುಂದೆ ಆಕುಲ ರಾಲಂ, ಆಲ್ಟರ್ನೆರಿಯಾ ಮಚ್ಚ /ಬ್ಲೈಟ್ ಸೂಟಿ ಬ್ಲಾಂಚ್	18.75-22.5	25-30/ ವెట్టುకు	10/ ವెట್ಟುಕು	40

ಉಪಯೋಗಿంచೆಂದುకು ಸಿಫಾರಸುಲು : ಉಪಯೋಗಿంచವಲಸಿನ ಮೊತ್ತ ಸಂರಕ್ಷಣ ವಿನಿಮ್ಮುಲು :ವೆತಿಕ್ಕೆ ನಡಿಪಿ ನೆಪೆಸಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ಲೆದಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ಲೆದಾ ಫುಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ಲೆದಾ ಮೋಟಾರು ಬಿಗಿంచబಡಿನ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್‌ನು ಮಿಂದಲಿಯುನವಿನಿ ಉపయోగಿంచండಿ.

ಉపಯೋಗಿంచవలసిన ಸಮಯಂ:

ಮುಂದು ಜాగ್ರತ್ತುಲು : 1. ಆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాల కంటెయినర్లు మరియు జంతువుల దాణాకు దూరంగా ఉంచాలి. 2. పిచికారీ ద్రావకాన్ని పిచికారీచేసేప్పుడు, కళ్ళకు మరియు చర్మానికి తగలనివ్వకూడదు. 3. పిచికారీ ఉపరును పీల్చడం మానుకోవాలి. గాలి దిశగా పిచికారీ చేయాలి. 4. పిచికారీ చేసిన తరువాత కలుషితమయిన దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను క్షుణ్ణంగా శుభ్రపరుచుకోవాలి. 5. పిచికారీ చేసేటప్పుడు ధూమపానం చేయవద్దు, దేనిని తినకూడదు మరియు పచ్చరించకూడదు. 6. పిచికారీ చేసే వ్యక్తి సరైన రక్షణ నియమాలు పాటించాలి (చేతి తొడుగులు, కళ్ళజోడు, బూట్లు).

ವಿವ್ವು లక్షణాలు : దురద, శ్వాస తీసుకోవడం కష్టసాధ్యం అవుతుంది, ఛాతీలో బిగుసుకున్నట్లుగా ఉండడం, గుండె దడదడలు, మరియు అల్లరక్తపోటు. కడుపులోనికి వెళ్ళడం వల్ల విశారం, వాంతి మరియు అతిఅతిసారాన్ని కలిగించవచ్చును. హైపోథైమియా మరియు తూలుడు (అటాక్సియా) కనిపించే లక్షణాలు.

ప్రాథమిక చికిత్స : ఒకవేళ దీన్ని మింగినట్లయితే, వాంతి చేయించాలి, చర్మానికి తగిలి కలుషితమయితే సబ్బు నీళ్ళతో జాగ్రత్తగా కడగాలి. రోగిని డాక్టరి దగ్గరికి తరలించాలి.

ವಿరుగుడు: నిర్దిష్టమైన విరుగుడు ఏది తెలియదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

ఫైటోక్సిసిటీ :

ఉపయోగించిన డబ్బాలను ధ్వంసం చేయడం: 1. ఖాళీ డబ్బాలను విరగొట్టి నివాస సంచారానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి. 2. ఉపయోగించిన ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఉపయోగించడం ఉంచడానికి బయట వాటిని కూడదు. 3. ఖాళీ డబ్బాలు మరియు మిగిలిన పదార్థాలు మరియు ప్యాకేజింగు మట్టిని వాటిని సురక్షితమైన పద్ధతిలో పర్యావరణం మరియు పిరు కలుషితం కాకుండా ధ్వంసం చేయాలి.

నిల్వచేసే పరిస్థితులు : 1. శిలీంధ్రనాశిని మందులు కలిగియున్న ఖాళీ డబ్బాలను, ఓపెన్ డబ్బాలలో ఇతర పదార్థాలను, నిల్వ చేసే గదులు లేదా ఆవరణలకు దూరంగా ఉండే గదులు లేదా పరిసరాలలో, ప్రత్యేకంగా తాళం వేయబడి ఉండే వేరే అలమారాలలో నిల్వచేయాలి. 2. శిలీంధ్రనాశిని మందులు నిల్వ ఉంచే గదులు బాగా వెలుతురు వచ్చేలా, గట్టి కట్టడములై, పాడిగా మరియు బాగా గాలిచొచ్చేలా ఉండాలి మరియు తగినంత కొంతలంలో ఉండాలి.

ఎచ్చరిక: ఈ లేబులు/కరపత్రంలో తెలియపరిచిన వంటలు కాకుండా మిగిలిన వంటలపై దీనిని ఉపయోగించకూడదు.

ತయారీదారులు: యుపిఎల్ లిమిటెడ్

రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయం : 3-11, జి.ఐ.డి.సి. వాపి-396195, గుజరాత్.

ಯುಥೇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ (ಸಂಪರ್ಕ

ಮೆಂಕೊಝೆಬ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ತಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಮೆಂಕೊಝೆಬ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ತಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಮೆಂಕೊಝೆಬ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಸಹಾಯಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊದ ಆರಂಭದ ಅಂಗಮಾರಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಅಂತ್ಯದ ಅಂಗಮಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ ಕಜ್ಜಿರೋಗ, ಅಕಾಲ ಎಲೆ ಉದುರುವಿಕೆ, ಆಲ್ಟರ್‌ನೇರಿಯಾ ಸ್ಪಾಟ್/ಬ್ಲೈಟ್ ಸೂಟೀ ಬ್ಲಾಚ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಮೆಂಕೊಝೆಬ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ (85% ಶುದ್ಧತೆ):	88.23% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಹರಡಿಸುವ ಘಟಕ :	
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೊ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	7.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಒದ್ದೆಯಾಗಿಸುವ ಘಟಕ :	
ಸಲ್ಫೊನೇಟೆಡ್ ನಫ್ಥಾಲೆನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್	1.50% ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಬೈಂಡರ್ : ಡೆಕ್ಸ್‌ಟ್ರೋಸ್	3.27% ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಒಟ್ಟು:	100.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆ ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾಂ)	ನೀರು (ಲೀ.)	ಕೊಯ್ಲು ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಆರಂಭದ ಅಂಗಮಾರಿ	750	1000	500	3-5
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ	ಆರಂಭದ ಅಂಗಮಾರಿ	750	1000	500	5-6
ಬಾಳೆ	ಕಪ್ಪುರೋಗ, ಅಕಾಲ ಎಲೆ ಉದುರುವಿಕೆ, ಸ್ಟಾಫ್/ಬ್ಲೈಟ್ ಸೂಟಿ ಬ್ಲಾಚ್	18.75 -22.5	25-30/ ಮರ /ಮರ	10/ ಮರ	40

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ : ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಸ್ಪ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣ : ಕೈಯಾರೇ ಚಲಾಯಿಸುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ಮೋಟರೈಸ್‌ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ.

ಬಳಸುವ ಸಮಯ:

ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಗಳು: 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಮೇವಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿರಿ. 2.ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ 3.ಸಿಂಪರಣಾ ತುಂತುರು ಪ್ರಾಸರೋಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ. 4. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನನ್ನೂ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಜಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಉದ್ದ ಕೈಯ ಆಂಗಿ, ಉದ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕೈ ಚೀಲಗಳು, ಶೂಗಳು, ಗಾಗಲ್‌ಗಳು, ಹ್ಯಾಟ್‌ಮತ್ತು ಮುಖವಾಡ ಮುಂತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರಿ.

ವಿಷತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತುರಿಕೆ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ತಡೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಎದೆ ಬಿಗಿ,ಎದೆ ಢವಗುಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಹೈಪೊಟೆನ್ಷನ್. ನುಂಗಿದ್ದರೆ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭೇದಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೈಪೊಥರ್ಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಟಾಕ್ಸಿಯಾ ಇವು ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಒಂಡೊಮ್ಮೆ ನುಂಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚಗುಳಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರಿ. ತ್ವಚೆಯು ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸಾಬೂನು

Uthane Advance (Contact Fungicide)

Mancozeb 75% WG

Mancozeb 75% WG fungicide containing Mancozeb active ingredient and balance auxiliaries and inert material. It is effective against Early blight of tomato, Late blight of Potato, Scab, Pre-mature leaf fall, alternaria spot/blight, sooty blotch in Apple.

Chemical Composition:

Mancozeb Technical (85% Purity)	: 88.23% w/w
Dispersing agent:	
Sodium Ligno sulphonate	7.00%w/w
Wetting Agent :	
Sulfonated naphthalene solfonate, sodium salt	1.50% w/w
Binder :	
Dextrose	3.27%w/w
Total :	**100.00.%w/w**

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Dosage/HA Formulation (gm)	Dilution in water (liter)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Potato	Late Blight	750	1000	500	3-5
Tomato	Early Blight	750	1000	500	5-6
Apple	Scab, Pre-mature leaf fall, alternaria spot/ blight sooty, blotch	18.75-22.5/tree	25-30/ tree	10/tree	40

Direction of Use : Plant Protection equipment used: Use manually operated knapsack sprayer or hand compression sprayer or foot sprayer or motorized sprayer etc.

Time of Application:

Precautions :

1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed.
2. Avoid contact with mouth, eyes, and skin.
3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of the wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing like long sleeved shirt, long pants, chemical resistant gloves, shoes, goggles, hat and mask while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning : Itching, reduced nasal congestion, tightness in chest, palpitation and hypotension. Ingestion may produce nausea, vomiting and diarrhea, Hypothermia and ataxia are characteristic.

First Aid : If swallowed, induce vomiting by tickling the back of the throat. In case of skin contamination, wash carefully with soap and water. Remove the patient to fresh air.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Phytotoxicity :

Disposal of Used Container :

1. The packages shall be broken and buried away from habitation.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. .
3. Packages by surplus material and wrapping shall be disposed of in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions :

1. The packages containing the fungicides shall be stored in original containers in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other articles or shall be kept separately under lock and key.
2. The room and premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, lit, ventilated and of sufficient dimension.

CAUTION: Not to be used on Crops Other Than Specified on this label/leaflet.

Manufactured by : UPL Limited
Regd. Office: 3-11, G.I.D.C., Vapi-396 195, Gujarat.

युथेन एडवान्स (स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

मैनकोजेब ७५ प्रतिशत घुलनशील कणक

मैनकोजेब ७५ प्रतिशत घुलनशील कणक एक फफुंदनाशक है, जिसमें मैनकोजेब सक्रीय तत्व तथा बाकी ओक्सिलरीज और इनर्ट मेटिरियल है। यह टमाटर की अंगेता अंगमारी, आलू की पछेता अंगमारी, सेब के प्रीमेच्यूर लीफ फॉल और आल्टरनारिया पर्ण दाग और लीफ बलाईट रोग को नियंत्रित करता है।

रासायनिक संरचना :

मैनकोजोब टेकनिकल (८५ प्रतिशत):	८८.२३% भार/भार
डिस्पर्सींग एजेंट:	
सोडियम लिग्नो सल्फोनेट	७.०० % भार/भार
वैटिंग एजेंट:	
सलफोनेटेड नाफथलीन सलफोनेट,	
सोडियम साल्ट	१.५० % भार/भार
बाईन्डर:डेक्सस्ट्रोज	३.२७ % भार/भार
योग :	**१००.००% भार/भार**

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
आलू	पछेता अंगमारी	७५०	१०००	५००	३-५
टमाटर	अगेता अंगमारी	७५०	१०००	५००	५-६
सेब	प्रीमेच्यूर लीफ फॉल और आल्टरनारिया पर्ण दग और लीफ बलाईट रोग	१८.७५ -२२.५/ पेड़	२५-३०/ पेड़	१०/पेड़	४०

उपयोग के लिए निर्देश : उपयोग में आनें वाले यंत्र : पीठ पर लादने वाला छिड़काव यंत्र या हस्तचालित या पैर चालित यंत्र या शक्ति चालित छिड़काव यंत्र आदि ।

प्रयोग का समय :

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :

१. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें । २. मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें । ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोऐं । ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र जैसे पूरी बाजू की कमीज, लम्बी पैंट, रसायनरोधी दस्तानें, जूतें तथा चश्में, टोपी व मुखौटा पहनना चाहिए ।

विष के लक्षण : खुजली, लालीमा, नाक में जम जाना, छाती में कसाव, थड़क और कम तनाव, निगल जाने पर, मिचली और अतीसार भी हो सकता है ।

प्राथमिक चिकित्सा : निगल जाने पर गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएं । चमड़ी पर गीरने से साबून और पानी से अच्छी तरह धो लीजिये । नरीज को खुली हवा में ले जाए ।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही है । लक्षण अनूसार इलाज करें ।

सौधविशाक्ततातः

खाली डिब्बों का निपटारा : १. डिब्बों को तोड़कर जन सामान्य से दूर स्थान पर गाड़ दें । २. उपयोग किए हुए डिब्बें को दोबारा काम में लाने से रोकने के लिए बाहर न छोड़े । ३. डिब्बें में बचा हुआ माल एवं धुलाई का पानी सुरक्षित तरीकें से फेंकें ताकि वातावरण एवं पानी प्रदूषित ना हो ।

संग्रहण की शर्तें : १. फफुंदनाशक को मूल डिब्बें में ही रहने दें और इनको अलग कमरों में अथवा ऐसे स्थान पर जहाँ अन्य सामान न रखा हो, संग्रह करें । अथवा ताला बंद अलमारी में रखें । २. कमरा या स्थान जहाँ फफुंदनाशक रखें ठीक से बना हुआ, सूखा एवं हवादार हो । वह प्रकाश युक्त और बड़े आकार का हो । कमरा रोशनीदार और मजबूत होना चाहिए ।

चेतावनी: इस लेबल/पत्रक में बताई गई फसलों के अलावा किसी अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

निर्माता : **युपीएल लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय : ३-११, जी.आई.डी.सी., वापी-३९६ १९५, गुजरात ।

युथेन ॲडव्हान्स (स्पर्शजन्य बुरशीनाशक)

मॅन्कोझेब ७५% डब्ल्युजी

मॅन्कोझेब ७५% डब्ल्युजी हे बुरशीनाशक असून त्यात मॅन्कोझेब हा सक्रिय घटक असतो आणि उरलेले सहाय्यक आणि निष्क्रीय घटक असतात. टोमॅटोतील अर्ली ब्लाइट (करपा), बटाट्यातील लेट ब्लाइट (चट्टया) आणि सफरचंदातील स्कॅब, कोवळी पानगळ, करप्याचे डाग/करप्याचे काजळी डाग यांच्याविरुद्ध हे बुरशीनाशक प्रभावी आहे.

रासायनिक रचना:

मॅंकोझेब टेक्निकल (८५% शुद्धता) :	८८.२३ % व/व
डिस्परसिंग एजंट :	
सोडियम लिग्नो सल्फोनेट	७.०० % व/व
वेटिंग एजंट :	
सल्फोनेटेड नॅप्थॅलिन	
सल्फोनेट, सोडियम सॉल्ट	१.५० % व/व
बाईंडर : डेक्सट्रोज	३.२७ % व/व
एकूण :	**१००.००% व/व**

उपयोग :

पीक (पिके)	रोगाचे सामान्य नाव	डोस/हेक्टर ए आय (ग्रॅम)	बुरशी-नाशक (ग्रॅम)	पाण्यात सौम्यीकरण (लिटर)	शेवटची फवारणी आणि कापणी यातील अंतर (दिवस)
बटाटा	चट्ट्या	७५०	१०००	५००	३-५
टोमॅटो	करपा	७५०	१०००	५००	५-६
सफरचंद	स्कॅब, कोवळी पानगळ, अल्टरनेरिया स्पॉट (डाग) आणि लीफ ब्लाइट सुटी ब्लॉच	१८.७५ -२२.५/ झाड	२५-३०/ झाड	१०/झाड	४०

वापरासाठी सूचना : वापरले जाणारे रोप संरक्षक साधन : हाताने चालवायचा नॅपसॅक स्प्रेयर किंवा हँड कंप्रेशन स्प्रेयर किंवा फूट स्प्रेयर किंवा मोटाराइड्ड स्प्रेयर इत्यादी वापरा.

वापराची वेळ :

सावधगिरी : १. अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थांची रिकामी भांडी आणि पशुखाद्य यांपासून लांब ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेला लागू देऊ नका. ३. फवारणीचे धुके श्वासाबरोबर शरीरात जाऊ देऊ नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४. फवारणी केल्यानंतर बुरशीनाशक लागलेले कपडे आणि शरीराचे भाग नीट धुवा. ५. फवारणी करताना काहीही खाउपिऊ नका, चघळू नका, धूम्रपान करु नका. ६. मिसळताना आणि फवारणी करताना लांब बाह्यांचा शर्ट, लाँग पँट, रसायन विरोधी हातमोजे, शूज, गॉगल्स, हॅट आणि मास्क असे संरक्षक कपडे/वेष घाला.

विषबाधेची लक्षणे : खाज, नाकात द्रव सातणे, छाती भरणे, छातीत धडधड होणे आणि रक्तदाब उतरणे. पोटात गेल्यास मळमळ, उलट्या, जुलाब, शरीराचे तापमान उतरणे, अटाक्सिया.

प्रथमोपचार : जर गिळले तर घशाच्या मागे गुदगुल्या करुन उलट्या काढा. त्वचेला लागले तर साबण आणि पाण्याने त्वचा व्यवस्थित धुवा. रुग्णाला ताज्या हवेत न्या.

प्रतिविष : विशिष्ट प्रतिविष ज्ञात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

रिकाम्या भांड्यांची विल्हेवाट : १) पॅकेजेस तोडून फोडून वस्तीबाहेर नेऊन पुरा. २) वापरलेली पॅकेजेस पुन्हा वापरली जाऊ नयेत म्हणून ती बाहेर उघड्यावर ठेवू नका. ३) उरलेले बुरशीनाशक आणि त्यांचे आवरण यांची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावा ज्यायोगे पर्यावरणीय आणि जल प्रदूषण होणार नाही.

साठवणीसाठी सूचना : ९) बुरशीनाशक असलेली पॅकेजेस, इतर वस्तु साठवण्याच्या खोल्या आणि आवारे यांपासून दूर असलेल्या स्वतंत्र खोल्या किंवा स्वतंत्रपणे कपाटांमध्ये कुलूप लावून, मूळ कंटेनर्समध्ये साठवली पाहिजेत. २) साठवणीच्या खोल्या आणि कोठ्या भक्कम बांधलेल्या, कोरड्या, हवेशीर, प्रकाश असणाऱ्या आणि ऐसपैस असल्या पाहिजेत.

सावधगिरी : या लेबलवर / पत्रिकेवर निर्देशित केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरु नये.
उत्पादक : **युपीएल लिमिटेड**
नोंदणीकृत कार्यालय : ३ - ११, जी.आय.डी.सी., वापी- ३९६ १९५, गुजरात.

युथेन एडवान्स (स्पर्श फुगनाशक)

मेन्कोझेब ७५% डब्ल्युजी

मेन्कोझेब ७५% डब्ल्यु जी फुगनाशकमां मेन्कोझेब सक्रिय तत्त्व अने अन्य सहायक ओक्सिलरीझ तेमज निष्क्रिय तत्त्वो समाविष्ट छे. ते टामेटा पर डाघ पडवानी शरूआतमां, बटाटाने डाघ पडवा पछी अने भींगडा थवा होय त्यारे, अकाळे पांदडा खरवानी स्थितिमां अने सफरथनने डाघ पडवा पर तेमज मेशवाळा चामेठा पर असरकारक छे.

रासायणिक संयोजन:

मेन्कोझेब टेक्निकल (८५% शुद्धता) :	८८.२३ % व/व
डिस्परसिंग एजंट :	
सोडियम लिग्नो सल्फोनेट	७.०० % व/व
वेटिंग एजंट :	
सल्फोनेटेड नॅप्थॅलिन	
सल्फोनेट, सोडियम साल्ट	१.५० % व/व
बंधक (बाईन्डर) तत्त्व : डेक्सट्रोझ	३.२७% व/व
कूल:	**१००.००% व/व**

भलामण:

पाक	फुगनी सामान्य स्थिति	मात्रा/हॅक्टर ए आई (ग्राम)	धनता (ग्राम)	पाण्यामां प्रमाण (लिटर)	छेल्ला छंटकाव अने पाक वापरवा वरचेनो गाळो (दिवस)
बटाटा	डाघ पड्या पछी	७५०	१०००	५००	३-५
टामेटा	डाघनी शरूआत	७५०	१०००	५००	५-६
सफरथन	भींगडानी शरूआत अकाळे पांडा खरवा डाघ पडवा, मेशवाळा चामेठा पडवा	१८.७५ -२२.५ /ञाड	२५-३० /ञाड	१०/ ञाड	४०

वापरवानी रीत: छोड रक्षण माटे वपरातो साधन: पीठ पर लादीने हाथेथी चलावावानो स्प्रेयर अथवा हाथना दबाणथी चलावावानो स्प्रेयर अथवा पगेथी चलावावानो ञारो अथवा मोटराईञ्डड स्प्रेयर, इत्यादिवापरो.

सावधानी: १. खाध वस्तुओ, खाध वस्तुओना डब्बाओ अने प्राणीओना खोराक थी दूर राखो. २. मोढुं, आंख अने त्वचाનो संपर्क टाळो. ३. छंटकावथी उत्पन्न थता पाथुने श्वासमां जता रोको. पवननी टीशामां छांटो. ४. छंटकाव कर्या पछी એनाथी दूषित कपडां अने शरीरना अवयवोने सारी रीते धोई नांखो. ५. छांटली वખते धूम्रपान ना करो, કંઈ પણ વસ્તુ ખાઓ કે ચાવો અથવા પીઓ નહીં. ६. मिश्रण बनावती पणते तेमજ छंटકાવ કરતી વખતે સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડાં જેમ કે લાંબી બાંયનું શર્ટ, ફૂલ પેન્ટ, રસાયણ પ્રતિરોધક હાથ–મોજા, બૂટ, गोगल्स (चश्मा), हेट अने मोरू (मास्क) पहेरो.

ञेर (विषबाधा) ना चिह्नोः खंજવાળ, બંધ નાકના ભરાવામાં કમી થવી, છાતીમાં દબાણ અનુભવવું, ઘબકારા વધવા તેમજ લોહીનું દબાણ ઓછું થવું. અન્ન નળીમાં પ્રવેશથી ઉબકા આવવા, ઊલટી અને ઝાડા થવા, શરીરનું તાપમાન ઘટવું તેમજ ગતિ–વિભ્રમ (ઠલન –ચલનનું નિયંત્રણ ખોવું) જેવી અસરો થાય.

प्राथमिक सारवारः રસાયણ ગળી જવાયું હોય તો ગળાના પાછલા ભાગને સ્પર્શથી ઉત્તેજીત કરીને ઉલટી કરાવો. ત્વચાને અસર થઈ હોય તો પાણી અને સાબુથી બરોબર ધોઈ નાંખો. દર્દીને ખુલ્લી હવામાં લઈ જાઓ.

विषબાधानुं मारणः કોઈ વિશેષ મારણ જાણમાં નથી. દેખાતા લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો.

फ्रेटोटोडिससीटी (पाटपविष):

उपरायेला डब्बा - खोખાनो निકાલः १. डब्बा–खोખાने भांगी नांખવા તેમજ રહેઠાણની જગ્યાથી દૂર દાટી દેવા. २. उपरायेले डब्बा के खोખाने बहार रेढा ना मूકવા જેથી એનો ફરી ઉપયોગ ન થઈ શકે. ३. પેકિંગના વધારાની પદાર્થોનો પણ સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવો જેથી હવામાન કે જલ પ્રદૂષણ ના થાય.

संગ્રह કરવાની रीतः १. ફુગનાશકના डब्बा–खोખાને એમના મૂળ પેકિંગમાં અલાયદા ઓરડામાં અન્ય વસ્તુઓ રાખી હોય એનાથી દૂર જુદા ઓરડામાં કે જગ્યામાં રાખવા અને તાળા–કૂંચી વાળી સુરક્ષામાં રાખવા. २. ફુગનાશક રાખવાનું મકાન–ઓરડો પાકો, મજબૂત અને હવાની અવર–જવર વાળો હોવો જોઇએ, એનું વાતાવરણ ભેજરહિત હોવું જોઇએ અને યોગ્ય મોકળાશ વાળો હોવો જોઇએ.

चेतावणी : આ લેબલ/પત્રિકામાં પર જણાવેલા છે તે સિવાયના પાકો પર વાપરવું નહીં.
ઉત્પાદનકર્તા : **युपीએલ લિમિટેડ**
नोंધણીકૃત કાર્યાલય : ૩–૧૧, જી.આઇ.ડી.સી., વાપી–૩૯૬ ૧૯૫, ગુજરાત.

ইউথেন অ্যাডভান্স (স্পর্শজনিত ছত্রাকনাশক)

ম্যাঙ্কোজেব ৭৫% ডব্লুজি

ম্যাঙ্কোজেব ৭৫% ডব্লুজি ছত্রাকনাশকে আছে ম্যাঙ্কোজেব সক্রিয় উপাদানসমূহ এবং বাদবাকী সহায়ক ও নিষ্ক্রিয় পদার্থ। এটা টমেটোর জলদি ধসা, আলুর নাবি ধসা এবং আপেলের মামড়ি, অকালে পাতা ঝরা, অল্টারনেরিয়া দাগ/ধসা, ভূসা দাগ দমনে প্রভাবদায়ক।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ :

ম্যাঙ্কোজেব টেকনিক্যাল (৮৫% বিশুদ্ধতা):	৮৮.২৩% ওজন/ওজন
ছড়িয়ে পড়ার পদার্থ :	
সোডিয়াম লিগনো সালফোনেট	৭.০০% ওজন/ওজন
সিক্তকারী পদার্থ :	
সালফোনেটেড ন্যাফথালিন	
সালফোনেট সোডিয়াম লবণ	১.৫০% ওজন/ওজন
বাইণ্ডার : ডেক্সট্রোজ	৩.২৭% ওজন/ওজন
মোট :	**১০০.০০% ওজন/ওজন**

সুপারিশ :

ফসল	রোগের সাধারণ নাম	মাত্রা/হেক্টর সঃ উঃ (গ্রাঃ)	ফর্মুলেশন (গ্রাঃ)	তরলীকরণের জল (লিটার)	শেষ স্প্রে থেকে ফসল তোলার মধ্যে অপেক্ষার সময়কাল (দিন)
আলু	নাবি ধসা	৭৫০	১০০০	৫০০	৩-৫
টমেটো	জলদি ধসা	৭৫০	১০০০	৫০০	৫-৬
আপেল	মামড়ি, অকালে পাতা ঝরা, অল্টারনেরিয়া দাগ / ধসা, ভূসা দাগ	১৮.৭৫-২২.৫/ গাছ	২৫-৩০/ গাছ	১০/গাছ	৪০

ব্যবহারের নির্দেশ : ব্যবহৃত গাছ সুরক্ষাকারী সরঞ্জাম: মানবচালিত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার বা হ্যাণ্ড কম্প্রেশন স্প্রেয়ার বা ফুট স্প্রেয়ার বা মোটরচালিত স্প্রেয়ার ইত্যাদি ব্যবহার হয়।

প্রয়োগের সময় :

সাবধানতা : ১. খাদ্য পদার্থ, খালি খাদ্যপাত্র ও পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখবেন। ২. মুখ, চোখ ও ত্বকের সংস্পর্শে আসা এড়াবেন। ৩. স্প্রে-কণার শ্বাসে যাওয়া এড়াবেন। বাতাসের অনুকূলে স্প্রে করবেন। ৪. স্প্রে করার পরে দূষিত পোশাক এবং দেহাংশ আগাগোড়া ধুয়ে নেবেন। ৫. স্প্রে করার সময়ে ধূমপান করা, পানীয় পান, কোনওকিছু খাওয়া ও চিবানো নিষেধ। ৬. মেশানো এবং স্প্রে করার সময়ে ফুলহাতা জামা, ফুলপ্যান্ট, রাসায়নিক নিরোধক হাতমোজা, জুতো, রোদচশমা, টুপি ও মুখোশের মতো সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরবেন।

বিষাক্ততার লক্ষণাদি : চুলকানি, কম হওয়া নাকের অবরুদ্ধতা, বুকে আড়ষ্টভাব, বুক ধড়পড়ানি এবং হাইপোটেনশন। গলাধঃকরণে গাবমি, বমি করা ও দাস্ত, হাইপোথার্মিয়া এবং অ্যাটাক্সিয়ার বৈশিষ্টতা হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা : গিলে ফেললে, টোগ্রায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করতে প্ররোচিত করবেন। ত্বকের সংস্পর্শে আসার ক্ষেত্রে, সযত্নে সাবান ও জল দিয়ে ত্বক ধুইয়ে দেবেন। রোগীকে মুক্ত বায়ুতে সরিয়ে নেবেন।

প্রতিষেধক : সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা।

বিষক্রিয়া :

ব্যবহৃত পাত্রাদির বিনষ্টি করণ : ১. প্যাকেজগুলো ভেঙ্গে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে। ২. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলোর পুনর্ব্যবহার রোধ করতে উহা যত্নতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩. প্যাকেজ বা উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং মোড়ক এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করতে হবে যাতে পরিবেশজনিত ও জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়।

মজুতকরণের অবস্থাদি : ১. ছত্রাকনাশক সম্বলিত প্যাকেজগুলো অন্যান্য পদার্থ মজুত করার জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা পরিসর থেকে দূরে, পৃথক ঘর বা পরিসরে মজুত করতে হবে অথবা পৃথক আলমারিতে তালা বন্ধের অধীনে রাখতে হবে। ২. ছত্রাকনাশক মজুতকরণের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা পরিসর হতে হবে সুনির্মিত, শুষ্ক, আলোকিত, বাতায়িত আর পর্য্যাপ্ত আয়তনযুক্ত।

সাবধানতা : এই লেবেলে সুনির্দিষ্টকরা ছাড়া অন্য কোনও ফসলে ব্যবহৃত হবে না।
নির্মাতা : **ইউপিএল লিমিটেড**
পঞ্জীকৃত কার্যালয় : ৩-১১. জি.আই.ডি.সি., ভাপী-396 195, গুজরাট।

યુથેન અડવાન્સ (સપરશી ફર્ફુંદીનાશક)

મૈનકૅઝેબ 75% ડબલ્યુસી

મૈનકૅઝેબ 75% ડબલ્યુસી ફર્ફુંદીનાશક વિંધ શ્રામિલ હન મૈનકૅઝેબ સકિરિયા તૅંડ અડે બાકી સહિયગૅતી અડે નિશ્રકિરિયા પદારથ। ઇદ ટમાટરાં વિંધ અગોડી કાંગિઆરી, આલુઅાં વિંધ પઢેડી કાંગિઆરી અડે સેબાં વિંધ પેપડી, પુરઢપૅંડરા પૅંડી દા ધ્રડના, અલટરનેરીઆ દાગ/કાંગિઆરી તે ઝુટી બલ્રાઙ'તે અસરદાર કાયૂ પાઉંદા હૈ।

રસાણિદક મિશ્રડન:

મૈનકૅઝેબ ટૈકનીકલ (85% શુંધતા):	88.23% વ/વ
ડિસપરસિંગ ઇંસૅટ:	
સૅડીઅમ લિગનૅ સલફૅનેટ	7.00 % વ/વ
વૈટિંગ ઇંસૅટ : સલફૅનેટઙ નાફથાલીન	
સલફૅનેટ, સૅડીઅમ સાલ્ટ	1.50 % વ/વ
બાર્ઈંડર : ડેકસમ્ટ્રૅસ	3.27 % વ/વ
કુંલ :	**100.00% વ/વ**

સિફારિશાં :

ફ્રસલાં	રેગ દા આમ નાં	મા./રૈ. કિ.ત્ર. (ગ્રા.)	ઘોલ દા ઢ્રમ્મુ. (ગ્રા.)	પાણ્ડી (લી.)	આખરી સપ્રે તેં કરાણ્ડી ત્રક ઉંડીક (દિન)
આલ્લુ	પઢેડી કાંગિઆરી	750	1000	500	3-5
ટમાટર	અગેડી કાંગિઆરી	750	1000	500	5-6
સેબ	પેપડી, પુરઢબ-પરપૅંડરા પૅંડી ધ્રડની, અલટરેનીઆ દાગ/કાંગિઆરી, ઝુટી બલ્રાઙ	18.75 -22.5/ રુંધ	25-30 રુંધ	10/ રુંધ	40

વરતડ લણી ડિનરેશ : વરતડ લણી પેંદા સુરૅંખિઆ ઉપ્રકરડ : દસડી ચૅંલડ વાલ્રા ઠપસૈક સપ્રેઅર, જાં દસડી ક્રૅપ્રેસ્રા સપ્રેઅર જાં ફ્રૂંટ (પૈરાં બલ્રા) જાં મૅટર વાલ્રા સપ્રેઅર આદિક વરતિઆ જા સકદા હૈ।

વરતડ દા ધ્રમાં :

સાવધાની : 1. ઇસ ઉડપાદ ડું ભેંજડ પદારથ, ભેંજડ વાલે ધાલી કૅંટેનરાં અડે પશ્રુ ચારે તેં દુર રૅંખે। 2. વદા ડું મુંહ, અૅંખાં અડે ત્વચા ધ્રાલ સંપર્કડ ના કરડ દિઉં। 3. સપ્રે મિસટ વિંધ સાપ્ર ના ધ્રલઉં। સપ્રે વદા વગડે દે પાસે તી કરૅ। 4. કૅમ ખ્રડમ કર લૅડ તેં બાદ દ પલીડ હૅંદે કપડે અડે સરીર દે ભ્રાગાં ડું પુરી તરાં ધોં લઉં। 5. સપ્રે કરદે હૅંદિઆં ના કુછ ખાઉં, પીઉં, ચબાઉં, ના તી ધ્રુમરપાન કરૅ। 6. વદા ડું મિલાઉંદે અડે સપ્રે કરદે હૅંદિઆં રૅંખિઆકારી સારે વસતડ, પુરીઆં બાંહવાં દી કમીસ, લૅંમી પતડ્રૂન, રબ્રડ દે દસતાંને, જુંતે, ગાગલ્સ, હૈટ તે મ્રાસક પાંઉં।

વિસૈલે અસર દે લૅંદ્રડ : ધુંસલી, ન્રૅંક દા ધ્રટિઆ જમાઉ, ઢ્રાતી દી ધ્રકસ્રડ, ધ્રૅંક–ધ્રૅંક તે લૅંબા ધ્રલૅંડ પૈશ્રર હૌ સકદા હૈ। દવા પેટ અંદર જાન્ર કારડ મડલી, ઉલટીઆં, દસ્તાં, હાણી પૅંથરમીઆ અડે અટાક્સમીઆ દી સ્રિકાજ્રિડ હૌ સકદી હૈ।

ઢ્રમટ ઇડ : દવા ગિલી જાજ્રા તે ગલે અંદર ઠકૅર કરકે ઉલ્ટી કરડ લણી ઉકમાંઉં। તવ્રા પલીડ ટૅંહ્રા તે સાપ્રડ તે પાણી ધ્રાલ પુરી તરાં ધોકે સાઢ કરૅ। રૅંગી ડું ખુલ્રી તાજી હવા વિંધ લૈ જાંઉં।

વિસ્રનિવારક : કિસે ધ્રાસ વિસ્રનિવારક દી જાનકારી નહીં હૈ। ડિસ્રમતી ડિસ્રાજ કરૅ।

વનસપતિક વિસૈલાપરત :

ધ્રાલી ડોંદે કૅંટેનરાં દ નિપટારા: 1. પૈકેજાં ડું ડૅંત–ભંડ કે આધાદી તેં દુર ગ્રમીડ વિંધ દહડ કર દેડા ચાહીદા હૈ। 2. ધ્રાલી ડોંદે કૅંટેનરાં ડું ખેંદે ગી બાંહર નહીં પદે રહિડ દેડા ચાહીદા તાં કિ દુબાંહરા ના વરતે જાન્ર। 3. પૈકેજાં ડું દેંદાં સુરૅંખિઆ સહિડ નિપટાઉંડા ચાહીદા પૈ તાં કિ વાડાવરડ અડે પાડ્રી દા પદુસ્રડ ના હૌ સકે।

મટૅરેજ દે ધ્રાલ્રડ : 1. ઢ્રવૅંદીનાશ્રકાં દે પૈકેજાં ડું ઉંઘાનાં દે મૅલિક કૅંટેનરાં અંદર હી, દુસીમાં ચીજાં–વસતાં, ભેંજડ પદારથ રૅંખડ વાલે કમરે તેં દુર કિસે વૅંખરે કમરે વિંધ ત્રાલા લગા કે રૅંખડા ચાહીદા હૈ। 2. ઢવૅંદીનાશ્રક મટૅરેજ કરકે રૅંખડ વાલે કમરે મજ્રબુડ બડે હૌંદે, સુંકે, સંગે રૌશ્રનીદાર, હવાદાર તે ધ્રુલ્રે ઢુલે રૌંદે ચાહીદા હૈ।

ચેતાવની: લીઙલેર/લેબલ વિંધ દરસાઈમાં ઢ્રમલાં તેં ધિના કિસે હોર ઢ્રમલ વિંધ ના વરતેં।

નિરમાતા : **ઝુપીએલ લિમિટેઢ,**
રનિ. આફ્રિસ: ૩–૧૧, જી.આણી.ઢી.સી., વ્રપી–૩૯૬૧૯૫, ગુજરાડ।